

EDOARDO VERNIER (*)

OSSERVAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE
DI *MYOTIS BECHSTEINI* (KUHL)
NELLE TRE VENEZIE E IN ITALIA

(*Mammalia Chiroptera*)

Riassunto. — Negli ultimi anni sono stati raccolti alcuni esemplari di *Myotis bechsteini*, che ne evidenziano la presenza o la persistenza in diverse Regioni d'Italia. Particolarmente interessante il rinvenimento di questo pipistrello nelle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Abstract. — *Observations on the distribution of Myotis bechstein (Kuhl) in Italy, particularly in the North-East regions (Mammalia Chiroptera).*

In recent years some new records of *Myotis bechsteini* were reported from Italy, particularly from the North-East regions (Veneto and Friuli-Venezia Giulia). The data presented here regard 4 records of this bat. The materials were collected in: Padova (Veneto); Province of Pordenone (Friuli-Venezia Giulia); Province of Vicenza (Veneto). *Myotis bechsteini* is one of the rarer Italian bats.

Key words: bats, bat distribution, *Vespertilionidae*, *Myotis bechsteini*.

Il Vespertilio di Bechstein, *Myotis bechsteini* (Kuhl, 1818), è uno dei più rari pipistrelli italiani. Secondo LANZA (1959) la sua presenza è stata segnalata con certezza solo per 8 località: 1) Varzi, Pavia, Lombardia; 2) Treviso, Veneto; 3) Rimini, Emilia-Romagna; 4) Pisa, Toscana; 5) Firenze, Toscana; 6) Sanseverino Marche, Macerata, Marche; 7) Villetta Barrea, Abruzzo; 8) Provincia di Napoli, Campania.

Negli ultimi anni ho avuto modo di studiare tre es. di questo raro pipistrello dalle lunghe orecchie, che confermano la sua presenza nelle Tre Venezie (dove era già stato segnalato da A. P. NINNI (1876), DAL PIAZ (1927) e GULINO & DAL PIAZ (1939).

(*) Dipartimento di Biologia, Università di Padova.

1. Regione Veneto, Provincia *Padova*. Una femmina trovata morta alla periferia di Padova il 12-9-1977: AV. mm 42,3; OR mm 21; TC mm 42; è il primo reperto della specie per la Provincia di Padova.

2. Regione Veneto, Provincia *Vicenza*. Un es. catturato a S. Tomio di Malo (Vicenza), in una galleria artificiale, dal naturalista Patrizio Rigoni nel settembre 1979: TC mm 46; OR mm 23; AV mm 40; C mm 35; Pp mm 9; LCB = 15,80; è il primo reperto della specie per la provincia di Vicenza.

3. Regione Friuli-Venezia Giulia. Provincia Pordenone. Un cranio di Vespertilio di Bechstein figura in una interessante collezione di crani di



Fig. 1. — Distribuzione di *Myotis bechsteini* in Italia; i punti contrassegnati da un numero si riferiscono alle località nuove o recenti segnalate nella presente nota (1, Padova; 2, S. Tomio di Malo, Vicenza; 3, provincia di Pordenone; 4, Pigna, Imperia).

Pipistrelli raccolti nella Grotta dell'Angelo o Grotta 127 Pn/F.VG (con ingresso a c. 1100 m) da soci del C.S.I.F. di Pordenone. Questo cranio (LCB = mm 16,20) rappresenta il primo reperto della specie per la provincia di Pordenone.

4. Infine, in BONZANO & AMELIO (1978), è citato un cranio di Vespertilio di Bechstein della grotta F. 7-813 Li/IM, in provincia di Imperia. Esso rappresenta il primo reperto della specie per la regione Liguria.

Dai dati sopra riportati risulta che il *Myotis bechsteini* è stato segnalato per nove regioni d'Italia. La sua presenza sembra particolarmente evidente nel Veneto (province di Padova, Treviso e Vicenza).



Fig. 2. — *Myotis bechsteini* di S. Tomio di Malo (Vicenza); esemplare conservato in pelle, con cranio a parte, della collezione P. Rigoni di Asiago (Vicenza).

Ringrazio P. Rigoni di Asiago, che mi ha permesso di esaminare il *Myotis bchsteini* della sua collezione, e la sig.na M. Scolaro, che ha fornito l'esemplare di Padova.

BIBLIOGRAFIA

- BONZANO C. & AMELIO M., 1978 - Le attuali conoscenze sulla fauna cavernicola della Provincia di Imperia - Atti XIII Congr. Naz. Spel. (S. Pellegrino T., 1974), *Rassegna Spel. ital. Mem.* 12: 236-249.
- DAL PIAZ G. B., 1927 - I Mammiferi fossili e viventi delle Tre Venezie. Parte sistematica N. 2. Chiroptera - *Studi trentini Sc. nat.*, 8: 171-198.
- GULINO G. & DAL PIAZ G. B., 1939 - I Chiroterteri italiani. Elenco delle specie con annotazioni sulla loro distribuzione geografica e frequenza nella Penisola - *Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Univ. Torino*, 47: 61-103.
- LANZA B., 1959 - Chiroptera. In: Toschi A. & Lanza B., Fauna d'Italia. IV. Mammalia - *Calderini*, Bologna, pp. 1-485, 164 figg.
- NINNI A. P., 1876 - Sopra i Chiroterteri veneti - *Atti Soc. veneto-trentina Sc. nat.*, 3: 203.